IPS-skala

hudstatus för benledda hörapparater

Perkutana implantat		Transkutana implantat
Inflammation	**I - POÄNG**	**Inflammation**
Intakt = 0 / Ej intakt = 1	Intakt hud?	Intakt = 0 / Ej intakt = 1
Nej = 0 / Ja = 1	Hudrodnad?	Nej = 0 / Ja = 1
Nej = 0 / Ja = 1	Svullnad?	Nej = 0 / Ja = 1
Nej = 0 / Ja = 1	Granulationsvävnad?	Inte aktuellt
Smärta	**P - POÄNG**	**Smärta**
Ingen smärta = 0	P = pain (smärta)	Ingen smärta = 0
Ja, smärta men utan ruckömhet OCH tid mindre än 6 veckor = 1	Förekomst av smärta direkt efter kirurgi eller utvecklats efter initial smärtfri period	Ja, utan minskad användning = 1
Ja, smärta med ruckömhet eller/och tid längre än 6 veckor = 2		Ja, med minskad användning = 2
Hudnivå	**S - POÄNG**	**Domning av huden**
Normal = 0	S = skin height	Inga huddomningar = 0
Förhöjd med det går att koppla på apparaten = 1	Hudnivå/domning av huden	Huddomningar, utan minskad användning = 1
Ovanför distansen/går inte att koppla på apparaten = 2		Huddomningar, med minskad användning = 2

IPS – poäng		Behandling
I 0-3, P 0, S 0-1	=	Ingen behandling
I 0, P1, S 0-1	=	Ingen behandling
I 1, P 1, S 0-1	=	Lokal behandling
I 2-3, P 0-1, S 0-1	=	Lokal behandling
I 0-4, P 2, S 0-1	=	Överväg peroral antibiotika
I 0-4, P 0-2, S 2 / I 4, P 0-2, S 0-2	=	Överväg byte till längre distans/lokalbehandling peroral antibiotika/kirurgi (mjukdelsreduktion/ byte till transkutant implantat)

IPS – poäng		Behandling
I 0-1, P 0, S 0-1	=	Ingen behandling
I 0, P1, S 0-1	=	Ingen behandling
I 1, P 1, S 0-1	=	Lokal behandling
I 2-3, P 0-1, S 0-1	=	Lokal behandling
I 0-4, P 2, S 0-1 2 / I 0-4, P 0-2, S 2 / I 4, P 0-2, S 0-1	=	Överväg magnetbyte/ minskad eller ingen användning så att huden får en möjlighet att läka/ ev. lokalbehandling alternativt peroral antibiotika/kirurgi (ta ut implantat/överväg byte till perkutant implantat)

Perkutana IPS – poäng

I = ____ P = ____ S = ____

Transkutana IPS – poäng

I = ____ P = ____ S =____

Formuläret är översatt från originalet i: Kruyt IJ, Nelissen RC, Johansson ML, Mylanus EAM, Hol MKS. The IPS-scale: A new soft tissue assessment scale for percutaneous and transcutaneous implants for bone conduction devices. Clin Otolaryngol. 2017 Dec;42(6):1410-1413. doi: 10.1111/coa.12922. Epub 2017 Jul 5. PMID: 28636124.
Översättningen är gjord 2026 av A. Persson, audionom/med.dr, Hörselverksamheten Göteborg, M. Eeg-Olofsson, ÖNH läkare/docent, Högsbo Närsjukhus och M. Johansson, ingenjör/med.dr, Oticon Medical AB.